Click to prove you're human

Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. La nortriptilina es un antidepresivo tricíclico. Este medicamento afecta a las sustancias químicas del cerebro que pueden estar desequilibradas en las personas con depresión. Los comprimidos de nortriptilina se utilizan para prevenir la depresión. Las cápsulas orales están disponibles tanto en forma genérica como en forma de medicamento de marca, que se denomina Pamelor. Usos de nortriptilina Trata la depresión y se puede utilizar en combinación con otros medicamentos para mejorar el estado de ánimo. aliviar la ansiedady aumentar los niveles de energía. Pertenece a la clase de antidepresivos tricíclicos, que afectan las sustancias químicas naturales del cerebro. Sus Preguntas:Boca seca, náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial, entumecimiento u hormigueo en las manos, pérdida de apetito, erupciones, picazón, hinchazón de los senos. Grave: Visión borrosa, visión de túnel, dolor ocular, hinchazón, movimientos musculares, sensación de mareo, convulsiones, dolor en el pecho, latidos irregulares, entumecimiento o debilidad, fiebre, dolor de garganta, dolor o dificultad para orinar. Busque atención médica inmediata si presenta síntomas graves. Hable con su médico sobre alergias u otros medicamentos antes de comenzar a tomar Nortriptilina. Informe a su médico si tiene afecciones como problemas respiratorios, problemas hepáticos, enfermedades cardíacas, glaucoma, el trastorno bipolaro problemas tiroideos. La nortriptilina puede afectar el ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT), el riesgo aumenta con ciertas afecciones médicas o medicamentos. Siga cuidadosamente las instrucciones del médico sobre la dosis, utilizando un dispositivo dosificador para líquidos. Comuníquese con su médico si no se siente mejor o tiene preguntas sobre su dosis. Genérico: Cápsulas disponibles en 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg. Marca (Pamelor): Cápsulas disponibles en las mismas concentraciones. Por lo general, omitir una o dos dosis no afecta el tratamiento, pero tome las dosis olvidadas rápidamente si se lo recomienda su médico. La sobredosis accidental puede ser dañina; busque atención médica inmediata si ha tomado más de lo recetado. Tu salud lo es todo: prioriza tu bienestar hoy. Programe su cita Para trastornos cardiovasculares: Mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y un ritmo cardíaco irregular; evite recuperarse de un ataque cardíaco reciente. Para el trastorno bipolar: Asegúrese de que el trastorno bipolar esté en tratamiento antes de comenzar a tomar nortriptilina. Para el glaucoma o aumento de la presión ocular: Vigilar de cerca mientras se toma Nortriptilina. Para retención urinaria o hipertiroidismo: Mayor riesgo de complicaciones; vigilar de cerca. Conservar a temperatura ambiente (68ºF a 77ºF), alejado del calor, la luz y la humedad; mantener fuera del alcance de los niños. Un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo de nortriptilina para el dolor lumbar crónico Navegación de entradas Una pequeña cantidad de niños, adolescentes y adultos jóvenes (de hasta 24 años) que durante los estudios clínicos tomaron antidepresivos (''elevadores del estado de ánimo''), como la nortriptilina, desarrollaron tendencias suicidas (pensar en hacerse daño o quitarse la vida, o planear o intentar hacerlo). Los niños, adolescentes y adultos jóvenes que toman antidepresivos para tratar la depresión u otras enfermedades mentales tienen más probabilidades de tener pensamientos suicidas que los niños, adolescentes y adultos jóvenes que no toman antidepresivos para tratar esas afecciones. Sin embargo, los expertos no saben con exactitud cuál es la magnitud de este riesgo ni de hasta qué punto debe considerarse al decidir si un niño o adolescente debe tomar o no un antidepresivo. Normalmente, los niños menores de 18 años no deben tomar nortriptilina, pero en algunos casos, el médico puede decidir que la nortriptilina es el mejor medicamento para tratar la afección de un menor.Debe saber que su salud mental puede cambiar de maneras inesperadas al tomar nortriptilina u otros antidepresivos, incluso si es un adulto mayor de 24 años. Es posible que desarrolle tendencias suicidas, sobre todo al comienzo del tratamiento, y cada vez que aumenten o disminuyan su dosis. Usted, su familia o su cuidador deben llamar a su médico inmediatamente si usted experimenta alguno de los síntomas siguientes: depresión nueva o que empeora, pensar en lastimarse o quitarse la vida, o planificar o intentar hacerlo, preocupación extrema, agitación, ataques de pánico, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido, comportamiento agresivo, irritabilidad, actuar sin pensar, agitación severa y excitación frenética anormal. Asegúrese de que su familia o cuidador conozcan los síntomas que pudieran ser graves para que puedan llamar al médico si usted no puede buscar tratamiento por su cuenta.Su proveedor de atención médica deseará verle con más frecuencia mientras toma nortriptilina, especialmente al inicio de su tratamiento. Asegúrese de cumplir con todas las citas en el consultorio de su médico.El médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando inicie su tratamiento con nortriptilina. Lea detenidamente la información y pídales a su médico o a su farmacéutico que le aclaren cualquier duda. También puede obtener la Guía del medicamento del sitio web de la FDA: de su edad, antes de tomar un antidepresivo, usted, sus padres o la persona encargada de su cuidado deben hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios de tratar su afección con un antidepresivo o con otros tratamientos. También deben hablar sobre los riesgos y los beneficios de no tratar su afección. Tenga presente que tener depresión u otra enfermedad mental aumenta considerablemente el riesgo de que desarrolle tendencias suicidas. Este riesgo es mayor si usted o alguien de su familia tiene o alguna vez ha tenido trastorno bipolar (ánimo que cambia de deprimido a anormalmente emocionado), o manía (ánimo frenético, anormalmente emocionado) o si ha pensado o ha intentado quitarse la vida. Hable con su médico sobre su afección, los síntomas y sus antecedentes médicos personales y familiares. Usted y su médico decidirán qué tipo de tratamiento es el indicado en su caso.